

Αγαπητό περιοδικό,

Είμαι 45 ετών, καπνίστρια και σε μια εβδομάδα έχω ραντεβού για εμβόλιο με AstraZeneca. Έχω ακούσει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για θρομβώσεις. Έχει νόημα να ξεκινήσω σαλοσπίρ ή κάποιο άλλο φάρμακο δυο-τρεις ημέρες νωρίτερα;

Αγαπητή αναγνώστρια,

Καταρχάς, συγχαρητήρια για το ραντεβού σου. Το εμβόλιο κατά του SARS-CoV-2 αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία της επιστήμης και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πράγματι, έχουν αναφερθεί κάποια περιστατικά θρομβώσεων 5-24 ημέρες μετά τον εμβολιασμό με εμβόλια που είχαν ως φορέα τον αδενοϊό. Τέτοια είναι το εμβόλιο AstraZeneca και Johnson & Johnson. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

Η πιθανότητα τέτοια θρόμβωσης είναι πάρα πολύ μικρή (περίπου 4-10 περιστατικά ανά 1.000.000!). Η διαφορά γίνεται αισθητή, αν σκεφτούμε ότι ο κίνδυνος θρόμβωσης σε γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά χάπια είναι 500-1.200 ανά εκατομμύριο! Επίσης, ο κίνδυνος θρομβώσεων σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό είναι πολλαπλάσιος (165.000 ανά εκατομμύριο, δηλαδή 16,5%!).

Οι θρομβώσεις αυτές συνοδεύονται από θρομβοπενία (χαμηλά αιμοπετάλια) και συνεπώς αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Το σύνδρομο αυτό έχει χαρακτηριστεί σαν VITT (vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia).

Όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί (Ευρωπαϊκός και Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, EMA και FDA, αντίστοιχα) έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος και προτείνουν την κανονική συνέχιση του προγράμματος εμβολιασμού παρά την εξαιρετικά σπάνια εμφάνιση αυτής της επιπλοκής.

Σε καμία περίπτωση η λήψη σαλοσπίρ δεν θα προστατέψει από την εμφάνιση αυτού του εξαιρετικά σπάνιου συνδρόμου. Δεδομένου μάλιστα ότι το σαλοσπίρ ανταγωνίζεται τη δράση των αιμοπεταλίων, μπορεί η λήψη του να αποδειχθεί και επικίνδυνη αν εμφανιστεί το σύνδρομο και πέσει ο αριθμός των αιμοπεταλίων (θρομβοπενία).

Επιπλέον, δεν έχει νόημα να προηγηθεί εργαστηριακός έλεγχος πριν τον εμβολιασμό. Τέλος, σε περίπτωση λήψης χρόνιας αντιπηκτικής αγωγής (π.χ. νεότερα αντιπηκτικά για κοιλιακή μαρμαρυγή) συστήνεται ο εμβολιασμός λίγο πριν τη λήψη της επόμενης δόσης, προκειμένου να αποφευχθεί ένα τοπικό μελάνιασμα.

Συμπερασματικά, αγαπητή αναγνώστρια, σου προτείνουμε να πας κανονικά και άφοβα στο ραντεβού για εμβολιασμό. Διότι, στην προκειμένη περίπτωση, το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο σύντομα διαθέσιμο εμβόλιο! 🟡

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:

Γ. Κασιμάτης

Π. Τσάκος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας

ΤΑΜΙΑΣ: Α. Γιαράκου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Δ. Ρίχτερ

ΜΕΛΗ:

Χ. Βλαχόπουλος, Α. Δήμα, Κ. Καλαϊτζή,

Χρ. Στεφανάδης, Δ. Τούσουλης,

Κ. Τούτουζας, Στ. Ψυχάρης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

Γ. Ανδρικόπουλος, Β. Βοπέας,

Α. Βούτσας, Δ. Γκολιάδης, Γ. Γκουμάς,

Ν. Κασιλάμπρος, Ε. Παπαστεριάδης



**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ**

Επιτροπή Φίλων του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Συμβουλίδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ν. Στενού

ΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη

ΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνά, Γ. Βαφάκη, Ε. Τούτουζα

